FIV genetic

Le traitement le plus efficace pour rèaliser votre rêve de devenir mère avec vos propres ovocytes.



IVI Fertility

FIV Genetic

Entre 37 et 40 ans, Plus de temps à perdre!

Pour les femmes âgées de 37 à 40 ans, le facteur temps est déterminant car, avec l'âge, les chances de devenir mères avec ses propres ovocytes diminuent. C'est pourquoi nous vous proposons la FIV Genetic, une combinaison innovante de techniques avancées et cliniquement validées, conçues pour augmenter significativement la probabilité de grossesse. Cette approche permet de réduire le temps d'attente pour obtenir une grossesse, ainsi que les coûts émotionnels et économiques. Les principaux avantages de la FIV Genetic sont :



Réduction du délai jusqu'à l'obtention d'une grossesse.



Réduction du nombre de transferts nécessaires.



Diminution du taux de fausse couche.


Diagnostic génétique préimplantatoire

Le diagnostic génétique préimplantatoire permet d'identifier certaines altérations des chromosomes (PGT-SR), de leur nombre (PGT-A) ou d'un gène spécifique (PGT-M). Grâce à ces analyses, nous pouvons détecter les embryons présentant des anomalies génétiques et ne transferer que ceux qui sont sains. Cela réduit le risque de fausse couche et augmente les chances d'avoir un bébé en bonne santé.

PGT [A]Seq

L’outil le plus avancé pour la sélection des embryons

IVI utilise la technologie la plus innovante pour la sélection des embryons. PGT[A]Seq est la seule technique cliniquement prouvée qui permet d’obtenir le plus grand nombre d’embryons sains par rapport aux autres techniques existentes à l’heure actuelle.



Précision maximale.



Nombre élevé d’embryons euploïdes informatifs.



Réduction du délai jusqu’à l’obtention d’une grossesse.



Réduction du nombre de transferts nécessaires.

Avantages de cette technologie

Réduction du délai d’attente jusqu’à la grossesse : La méthode unique PGT[A]Seq, utilisée par IVI fait appel à des méthodes de séquençage de dernière génération qui améliorent la qualité des données obtenues et permettent des résultats d’une précision sans précédent.

Réduction du risque de fausse couche : Cette méthode évite les transferts infructueux d’embryons anormaux (aneuploïdes) en réduisant considérablement le taux de fausses couches.

Précision supérieure par rapport aux autres techniques : Cette technique contribue à détecter avec une grande précision les embryons triploïdes et les contaminations de l’ADN. Elle évite de classer des embryons euploïdes comme anormaux ou mosaïques.

Moins de complications pendant la grossesse : Sachant que les embryons obtenus sont sains, on n’en transfère qu’un (SET).

PGT[A]Seq : quand le test est-il réalisé ?

Dans quels cas est-elle recommandée ?

La fécondation in vitro avec PGT[A] Seq est recommandée dans les situations suivantes :


- Femmes de plus de 35 ans.
- Femmes ayant réalisé deux cycles de FIV ou plus sans succès.
- Femmes ayant subi deux fausses couches ou plus sans cause connue.
- Femmes ayant présenté des anomalies chromosomiques lors de précedentes grossesses, notamment par FIV.
- Le sperme présentant des anomalies lors de la méiose ou un faible nombre de spermatozoïdes.

Jour 1 – Embryon :
la fécondation in vitro a lieu et le développement embryonnaire commence.

Jour 2

Jour 3

Jour 4



Au cinquième jour, un échantillon de cellules de l'embryon est prélevé et analysé. analyzed.

Jour 5/6 :
après l'application de la méthode PGT[A]Seq, les embryons présentant le nombre correct de chromosomes peuvent être identifiés.

L'analyse combinant séquençage de nouvelle génération (NGS) et polymorphisme nucléotidique unique (SNP) permet d'augmenter significativement la précision du PGT-A.

Chronologie du traitement

Phase 1



1. Consultation - Phase de consultation

Diagnostic / traitement personnalisé



2. Début du traitement



3. Ponction ovocytaire + FIV

15–25 jours de préparation / surveillance du développement folliculaire



4. Développement embryonnaire



5. Biopsie et vitrification des embryons

5 jours de développement embryonnaire



6. PGT[A]Seq

10 jours d'attente pour les résultats



7. Résultats

Phase 2



8. Dévitrification + transfert

10–15 jours préparation de l'endomètre



9. Test de grossesse bêta-hCG

11 jours attente du résultat



10. Échographie de grossesse

20 jours suivi de la grossesse

COÛT DE LA FIV GENETIC

Nous analysons vos embryons afin d'éviter la transmission de maladies génétiques.

À partir de 9 200 €

Pourquoi IVI ?



Première consultation en ligne

- Lors de ce premier pas, un·e gynécologue IVI rélisera un diagnostique personnalisé.



Pas de listes d’attente

- N’attendez plus pour devenir mère, contac-tez-nous dès aujourd’hui.



Financement

- Nous finançons votre traitement. Consultez les conditions dans votre clinique.

Où souhaitez-vous réaliser votre traitement ?



Madrid



Barcelona



Valencia



Málaga



Saragossa



Palma de Mallorca



Alicante



Bilbao



Saint Sébastien



08 00 941 042
ivi-fertilite.fr